



O.P. OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO

Società Cooperativa Agricola

Iscritta all'Albo Società Cooperative a mutualità prevalente con il n° A 100107

PROGRAMMA SOSTEGNO SETTORE OLIO D'OLIVA ART.29 REG.(UE) 1308/2013 MISURA 2C MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA

CONTROLLI PER LA LOTTA INTEGRATA AI PARASSITI DELL'OLIVO

BOLLETTINO N. 13 VALIDO DAL 17/08/2016 AL 24/08/2016

MOSCA OLEARIA:

Malgrado non piova da giorni, le previsioni del tempo indicano una bassa probabilità di precipitazioni a metà settimana. Pertanto non bisogna abbassare la guardia in quanto nell'intero comprensorio di Canino il rischio di attacco del parassita risulta sempre molto elevato.

Si rende, quindi, indispensabile tenere sotto controllo i propri oliveti ormai con cadenza settimanale mediante il prelievo dei campioni di olive da portare direttamente presso il laboratorio analisi dell'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino o presso i punti di raccolta dislocati nei comuni esterni nei giorni addetti al ricevimento (nel Comune di Ischia di Castro di domenica, presso il Comune di Arlena di Castro di mercoledì e Tessennano di giovedì).

I Tecnici dell'Oleificio sono a disposizione per effettuare le analisi dei campioni di olive per rilevare le infestazioni in atto per ogni altro consiglio utile.

Per gli olivicoltori che sono stati costretti ad effettuare un intervento fitosanitario i tecnici sono a disposizione anche per controllare l'efficacia e la persistenza del principio attivo utilizzato.

Il campionamento va eseguito prelevando 100 olive prese a caso su 10 piante di media produzione, ad altezza d'uomo distinto almeno per le cultivar tardive da quelle precoci su ogni località del socio al fine di poter eventualmente intervenire se necessario in modo selettivo e tempestivo.

COCCINIGLIA DI MEZZO GRANO DI PEPE:

Questo insetto risulta poco presente negli oliveti del comprensorio in quanto il caldo ed i parassiti naturali ne tengono sotto controllo la popolazione. Si riconosce facilmente per la somiglianza dell'adulto appunto a mezzo grano di pepe attaccato nella pagina inferiore della foglia. In questo periodo dell'anno si stanno schiudendo le uova e le neanidi vengono diffuse sulla pianta dal vento e dalle formiche.

Nel caso di forte presenza si consiglia di prelevare un rametto infestato da far verificare ai tecnici dell'oleificio per valutare la necessità di intervento.



Regg.(UE) 611-615/2014
Annualità 2015/2016



Programma finanziato con il contributo della
Unione Europea e dell'Italia